

Vaccination par COMINARTY®

Pas de vaccination

Si ATCD d'anaphylaxie à un traitement contenant du PEG(*) ou du polysorbate ET bilan ou avis allergologique **négatif**.

⚠ En cas de réaction allergique grave ou immédiate après la 1^{ère} dose, la 2^{nde} est contre-indiquée

Vaccination et surveillance standard 15 minutes	Vaccination et surveillance prolongée 1 heure	Vaccination avec avis allergologue seulement si bénéfice majeur à la vaccination
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ATCD de réaction d'allure allergique tardive (survenant au-delà d'1 heure) au PEG ou au polysorbate, ou à une autre substance. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ATCD de réaction immédiate mais sans signe de gravité à un médicament ou une autre substance (par exemple urticaire isolée ou oedème du visage après une prise de Ciflox®, dont l'enrobage contient du polysorbate). ➤ ATCD d'anaphylaxie à un médicament connu avec identification de l'allergène (différent du PEG ou du polysorbate) après bilan allergologique. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ATCD d'anaphylaxie (survenue rapide d'un oedème laryngé, d'une détresse respiratoire, d'un choc...) à un traitement contenant du PEG ou du polysorbate, et bilan allergologique d'imputabilité non fait → avis allergologue. ➤ Anaphylaxie prouvée au PEG : avis allergologue si bénéfice majeur à la vaccination.

(*) Le PEG est le constituant des macrogols. Il est présent dans différents médicaments tels que les interférons pégylés (alpha dans le traitement de certaines hépatites virales et anti-cancéreux, et bêta dans le traitement de la SEP), les facteurs de croissance hématopoïétique pégylés (G-CSF et EPO), la naloxone pégylée, certaines chimiothérapies (irinotécan, asparaginase et doxorubicine pégylés), le certolizumab pégylé, et le facteur VIII pégylé.

On peut également trouver du PEG dans l'enrobage de nombreux traitements (antibiotiques, AINS...) ; dans la situation d'une réaction à ces traitements, **l'allergène est exceptionnellement le PEG.**